

AFRIKKALAINEN SIKARUTTO, KLASSINEN SIKARUTTO JA SUU- JA SORKKATAUTI

Oireet:

- ruokahaluttomuus
- uneliaisuus
- kuume
- silmien punoitus ja silmävuoto
- turvonneet imusolmukkeet
- hengitystieoireet
- porsailla kuolleisuuden äkillinen kasvu
- äkkikuolemat ilman edeltäviä oireita
- ontuminen, takajalkojen jäykkyys, horjuminen, vapina tai kouristukset
- jalkojen, vatsan ja korvien ihon punerrusta tai sinerrystä
- verenpurkaumat iholla
- rakkulat sorkkarajassa, kärsässä ja kielessä
- luomisia ja kuolleina/muumioina syntyneitä porsaita

Miten toimia:

- ota välittömästi yhteys alueesi kunnaneläinlääkəriin
puh: _____
- mikäli et tavoita kunnaneläinlääkəriä, ota yhteys läänineläinlääkəriin

puh: _____



RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority



4.



5.



6.



7.

Kuvat: College of Veterinary Medicine (TAMU) (1), Community Reference Laboratory for CSF, Institute of Virology, School of Veterinary Medicine Hannover (2, 4-7) ja Dr. Gregg at the Plum Island Animal Disease Center and the CFSPH (6).

Lisätietoja:

- www.ruokavirasto.fi



RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority