



RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

Susiraporttilomake

Lähetet: E20241231-064

Tutkimuslajinro: OPAT-1503

Taustatieto: Susi ei päässyt liikkeelle, takajalat eivät kantaneet, lopetettu poliisin määräyksellä

Susi

sukupuoli: naaras

paino: 22 kg

ikäluokka: aikuinen

paikkakunta: Siikalatva

kuolin-/löytöpäivä: 31.12.2024

Tulokset (tutkimustodistuksen diagnoosit ja lausunto)

Nääntyminen

Vanhoja vammoja

Suden ravitsemustila oli hyvin heikko. Rasvakudosta ei ollut jäljellä nahan alla tai sisäelinten ympärillä. Mahalaukku oli tyhjä, vähän tuoretta verta oli nielty mahaan. Sudessa todettiin arpeutuneita vammoja. Oikealla kyljellä oli 4. kylkiluussa voimakas paksuuntuma (parantunut murtuma) ja tässä kohtaa oli rintaontelon sisäpinnalla laajalti vanhan rintakalvon tulehduksen (pleuriitin) arpia. Oikean 11. kylkiluussa oli vastaava, lievempi muutos. Rintaontelon takaosassa vasemmalla puolella oli myös pleuriittiarpea rintakalvossa ja kylkilihaksissa tummaa, vanhaa vertymää. Vatsaontelon takaosassa, vatsanpeitelihaksissa, oli vanhoja, arpeutuneita repeämiä, joihin vatsapaitaa oli tarttunut kiinni. Lantio-ontelon kudoksissa oli laajalti vanhan verenvuodon aiheuttamaa värjäytymistä ja paikoin vatsakalvontulehduksen jälkiä. Lannelihakset ja reisilihakset olivat surkastuneet.

Hampaat olivat voimakkaasti kuluneet, terävät kärjet tasoittuneet. Etuhampaita oli lohjennut, yksi pieni poskihammas (ylä-P1) puuttui ja kahden isomman poskihampaan (ylä-P4 ja ala-P3) kruunut puuttuivat. Kyynärnivelissä värttinäluun pään etureunaan oli muodostunut ylimääräistä rustokudosta. Lisämunuaisissa todettiin kuorikerroksen hyvänlaatuista liikakasvua, hyperplasiaa. Kohtu oli suhteellisen iso. Vasemmassa kohdunsarvessa erottui neljä tummaa istukanjälkeä edellisestä tiineydestä. Turkki oli normaali talviturkki. Etutassuissa oli pitkät kynnet, takatassuissa lyhyemmät. Lopetusvamma oli päässä, osuma kallon takaosaan.

Sudesta otetuissa röntgenkuvissa näkyi pään alueella runsaasti luodinsiruja lopetuslaukauksesta. Sivulöydöksenä todettiin alkavaa spondyloosia (silloittumista) 5. ja 6. rintanikaman välillä.

Rabieksen varalta kielteinen.

Ekinokokkiloisia ei todettu.

Trikinella-suvun (*Trichinella* spp.) loisia ei todettu.