



Susiraporttilomake

Lähet: E20260107-022

Tutkimuslajinro: OPAT-1

Taustatieto: Poliisin määräyksellä lopetettu ontumisen takia

Susi

sukupuoli: uros

paino: 15,4 kg

ikäluokka: nuori

paikkakunta: Siikalatva

kuolin-/löytöpäivä: 5.1.2026

Tulokset (tutkimustodistuksen diagnoosit ja lausunto)

Diagnoosi: Polyartriitti (moniniveltulehdus)

Susi oli nuori ja pienikokoinen. Ravitsemustila oli laiha ja lihaskunto heikko, raajojen lihakset olivat kapeita. Sutta oli ammuttu rintaonteloon, rintalasta ja kylkiluita oli murtunut. Turkki oli paksu ja normaalikuntoinen, anturoiden välissä oli poikkeuksellisen pitkät karvat. Molemmissa takajaloissa kintereen tarsaaliluiden alueella oli voimakasta, röpelöistä luun liikakasvua. Myös muissa nivelissä oli vaihtelevia tulehdusmuutoksia: vasemmassa kyynärässä ja oikeassa ranteessa oli lisääntyneesti kellertävää nivelnestettä, oikean olkaluun päässä nivelpinnalla oli verestävä murtuma, lonkkanivelten nivelpinnat olivat tummuneet. Hampaat olivat hyväkuntoiset ja pysyviin vaihtuneet. Ihon alla tai vatsaontelossa ei ollut juurikaan rasvakudosta. Keuhkot olivat veriset ampumisen jäljiltä. Mahalaukku oli täynnä hirvenkarvaa, seassa oli muutama kovempi palanen ohutta luuta tai rustoa. Suolistossa oli samaa sisältöä, uloste oli kovaa. Muissa sisäelimissä ei todettu sairauteen viittaavia muutoksia. Kuolemanjälkeiset muutokset olivat kohtalaisia. Röntgenkuvissa todettiin luodinsiruja rintalastan seudulla.

Nivelnesteen bakteeriviljelyssä todettiin *Streptococcus dysgalactiae*.

Rabieksen varalta kielteinen.

Ekinokokkilaisia ei todettu.

Trikinella-suvun (*Trichinella* spp.) loisia ei todettu.

Nuorilla eläimillä moniniveltulehdukset ovat yleensä seurausta aiemmin sairastetusta bakteeri-infektiosta. Kinnernivelen tulehdus oli aiheuttanut suden tarsaaliluiden epämuodostumisen, jonka seurauksena liikkuminen on ollut hankalaa.