

9.5.2014

Siipikarjan Gumboro – rokotussuositus taudinpurkaustilanteessa

Rokote	Elävä GUMBORO	Tapettu GUMBORO
	1. rokotus 2-8 vkon iässä, tehoste tarvittaessa	16-20 vko:n iässä. (viim. 3-4 vkoa ennen muninnan alkua)
Munantuotanto		
Isovanhemmat	X	X
Vanhemmat	X	X
Tuotanto	X*	
Broilerit		
Isovanhemmat	X	X
Vanhemmat	X	X
Tuotanto	(X)**	

X* Rokotus 3 – 5 viikon iässä

(X)** Ongelmatiloilla 10 - 14 vuorokauden iässä.

Rokotusten väliksi suositellaan 4 viikkoa, välin on aina oltava vähintään 2 viikkoa.

Gumboro-rokotussuositus akuutissa taudinpurkaustilanteessa 2014:

- Emot rokotetaan huolellisesti ohjeita noudattaen, jotta suojaavia vasta-aineita siirtyy munan välityksellä poikasille. Emolinnut rokotetaan 3-8 viikon iässä elävällä juomavedessä annettavalla rokotteella ja 16-20 viikon iässä tapetulla injisoitavalla rokotteella. Tarkoituksena on suojata emolintuja kasvatuskaudella ja antaa kuoriutuville poikasille mahdollisimman korkea ja tasainen suoja. Poikasten suoja riittää yleensä noin 2 - 3 viikon ikään asti.
 - Nuorikkokasvattamoon tuodaan vain asianmukaisesti rokotettujen emojen jälkeläisiä.
- Tuotantopolven **munintakananpoikaset** rokotetaan kasvattamossa emolta saatujen suojaavien vasta-aineiden loppuessa (n. 3-5 viikon iässä). Elävä rokote annetaan juomavedessä kasvatuskaudella. Jos poikaset rokotetaan jo 2-3 viikon iässä, niillä saattaa olla vielä emolta saatuja vasta-aineita. Tällöin ne kannattaa rokottaa vielä parin viikon kuluttua toisen kerran, jotta kaikki linnut saavat suojan.
 - Munintakanalaan siirretään vain rokotettuja lintuja, joiden vasta-ainetaso on tutkimuksin todettu riittäväksi. Immunitietin muodostuminen kestää n. 2 viikkoa rokotuksesta.
- Nuorikkojen rokotusohjelmaa muokataan tarpeen vaatiessa. Broilerin rokotuksesta päätetään tapauskohtaisesti erikseen teurastamon terveydenhuoltoeläinlääkäriä konsultoiden.