



Bruselloosi eläimillä

Brucellos hos djur

a)




b)




Kuvat a ja b. Brusellan varalta tutkittuja a) lypsykarjoja ja b) nautoja vuodesta 2000 (Lähde: Eläintautien vastustus- ja seurantaohjelmat, Evira (nykyinen Ruokavirasto))

Figur a-b. a) Mjölkbessättningar och b) nötkreatur undersökta för brucella från och med 2000 (Källa: Program för bekämpning och övervakning av djursjukdomar, Evira (nuvarande Livsmedelsverket))

c)




d)



Kuvat c ja d. Brusellan varalta tutkittuja c) lampaita ja d) vuohia vuodesta 2000 (Lähde: Eläintautien vastustus- ja seurantaohjelmat, Evira (nykyinen Ruokavirasto))

Figur c-d. c) Får och d) getter undersökta för brucella från och med 2000 (Källa: Program för bekämpning och övervakning av djursjukdomar, Evira (nuvarande Livsmedelsverket))

e)



Kuva e. Brusellan varalta tutkittuja e) sikoja vuodesta 2000 (Lähde: Eläintautien vastustus- ja seurantaohjelmat, Evira (nykyinen Ruokavirasto))

Figur e. e) Svin undersökta för brucella från och med 2000 (Källa: Program för bekämpning och övervakning av djursjukdomar, Evira (nuvarande Livsmedelsverket))