



Sinikielitauti eli Bluetongue



Sinikielitauti on polttiaisten levittämä märehöiden ja kamelieläinten virustauti. Suomessa tautia ei ole todettu.

Sinikielitauti ei tartu ihmiseen. Virusta kantavan polttiaisen pisto on myös täysin vaaraton koirille, kissoille ja hevosille. Sinikielitauti ei tartu suoraan märehöijästä toiseen, mutta emo voi tartuttaa sikiön. Virus ei leviä tavaroiden välityksellä eläimestä toiseen, kuten ei myöskään maidon tai lihan välityksellä.

Viime vuosina tauti on levinnyt hyvin laajalti Euroopassa ja aiheuttanut suuria taloudellisia tappioita tiloille aiheuttaen mm. maidontuotannon laskua, hedelmättömyyttä, sikiökuolleisuutta sekä heikkojen vasikoiden ja karitsoiden syntymistä. Tautia vastustetaan ensisijaisesti rajoittamalla eläinten kuljetuksia tartunta-alueella. Myös rokotuksia voidaan käyttää taudin hallintaan.

Tautiepäily

Eläinten oireiden tunnistaminen on taudin vastustuksessa ensiarvoisen tärkeää. Heti oireita havaittaessa tulee ottaa yhteyttä eläinlääkäriin, joka vahvistaa tarvittaessa epäilyn ja ottaa mahdolliset näytteet.

Oireet

Sinikielitauti nimi tulee hengitysvaikeuksista johtuvasta hapenpuutteesta aiheutuneesta sinisestä kielestä. Tämä oire on kuitenkin harvinainen.

Lampailla oireet ovat usein voimakkaammat kuin naudoilla. Myös oireettomat eläimet voivat erittää virusta. Oireet voivat olla todella lieviä eikä kaikkia alla mainittuja oireita nähdä samalla eläimellä tai edes samalla tilalla.

Naudan oireet:

- kuume ja huonokuntoisuus
- voimakas syljeneritys, silmä- ja sierainvuodot
- turvotus ja punoitus suun, kielen ja sierainten alueella
- haavaumat suussa ja suun ympärillä
- turvotus pään ja kaulan alueella
- turvotus tai haavaumat vetimien alueella

Lampaan oireet:

- usein korkea kuume ja huonokuntoisuus
- hengitysvaikeudet, sininen kieli
- voimakas syljen eritys, silmä- ja sierainvuodot
- turvotus ja punoitus suun, kielen ja sierainten alueella
- haavaumat suussa ja suun ympärillä
- turvotus pään ja kaulan alueella
- ontuminen sorkanrajan ihotulehduksen vuoksi

Vuohilla oireet ovat kuten lampailla, joskin usein lievemmat.

Alpakoilla on samoja oireita kuin naudoilla, joskin tietoa niistä on rajallisesti.

Lisätietoja: www.evira.fi

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3, 00790 Helsinki
www.evira.fi

