

## Susiraporttilomake

|  |                        |         |          |  |  |
|--|------------------------|---------|----------|--|--|
| <b>Lähte</b>   | <b>Tutkimuslajinro</b> |         |          |  |  |
| E20190213-007  | OPAT-175               |         |          |  |  |
|  |                        |         |          |  |  |
| Susi   | naaras                 | 25,5 kg | aikuinen |  |  |
| Liekka   | 8.2.2019               |         |          |  |  |
|  |                        |         |          |  |  |
|  |                        |         |          |  |  |
| <b>Taustatieto</b>   |                        |         |          |  |  |
| Lopetettu loukkaantuneena poliisin luvalla   |                        |         |          |  |  |
| <b>Tulokset (tutkimustodistuksen diagnoosit ja lausunto)</b>   |                        |         |          |  |  |
| <p>Nääntyminen<br/>Alaleuassa ja kylkiluussa vanhempia, huonosti parantuneita murtumia.</p> <p>Susi oli hyvin heikkokuntoinen, aikuinen naaras. Rasvakudos puuttui ja lihakset olivat surkastuneet, silmät silmäkuoppiin painuneet. Sudessa todettiin vanhempia, huonosti parantuneita vammoja. Alaleuan kärjessä oli keskilinjän liitoskohdassa ja vasemman kulmahampaan edessä vanhat murtumat, jotka ympäriltä arpeutuneet, fibroottiset, murtunut palanen heilui hampaineen. Oikean seitsemännen kylkiluun puolivälissä vanhempi, huonosti parantunut murtuma, jossa luun päät kiinni toisissaan sidekudoksella, eivät ole luutuneet yhteen. Vammat ovat todennäköisesti syntyneet iskun, esimerkiksi hirven potkun, tai törmäyksen, autokolarin seurauksena. Alaleuan vamma on estänyt normaalin puremisen ja saalistuksen. Hampaat kuluneet, molemmat alakulmahampaat juureen asti, muissa etuhampaissa voimakkaita kulumia, pulpaan asti. Sisäelimissä ei todettu silmämääräisiä sairautteen viittaavia muutoksia. Paljain silmin havaittavia loisia ei todettu. Mahalaukussa oli vain vähäinen määrä tummaa, limaista nestettä ja yksi noin 10 cm pituinen, noin 0,5 cm läpimittainen männyn oksanpala. Suolta ei avattu. Kohdussa erottui ulospäin useampi istukan arpi. Kynärnivelten nivelpinnoilla kohtalaisen vähäisiä rustovaurioita, nivelrikkomuutoksia. Turkki oli normaali. Susi oli lopetettu ampumalla, niskan kudoksissa noin 7-8 mm läpimittaisia hauleja ja niiden aiheuttamia vammoja ja verenvuotoja. Pilaantumismuutokset olivat kohtalaiset. Sudesta otetussa röntgenkuvassa ei todettu muihin vammoihin viittaavaa.</p> <p>Rabieksen varalta kielteinen.<br/>Ekinokokkiloisia ei todettu.<br/>Trikinella-suvun (<i>Trichinella</i> spp.) loisia todettiin.</p> |                        |         |          |  |  |